




* дані за показниками продуктивності
несучки Lohmann



ЧЕСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГОДІВЛІ ПТИЦІ

PRO DRŮBEŽ

- КОМБІКОРМИ
- БІЛКОВО-ВІТАМІННО-МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
- ВІТАМІННО-МІНЕРАЛЬНІ ПРЕМІКСИ



ДЛЯ КУРЧАТ ТА НЕСУЧОК

ЕФЕКТИВНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ КУРЧАТ ТА НЕСУЧОК



КОМБІКОРМ для КУРЧАТ, КАЧОК та ГУСЕЙ СТАРТЕР 0-8 тижнів
КОМБІКОРМ для курчат ВИРОЩУВАННЯ 9-16 тижнів
КОМБІКОРМ для НЕСУЧОК ПРОДУКТИВНИЙ ПЕРІОД
БМВД НЕСУЧКА 20% від 17 тижнів до КІНЦЯ НЕСУЧОСТІ
ПРЕМІКС для НЕСУЧКИ 2,5% від 17 тижнів до КІНЦЯ НЕСУЧОСТІ

УМОВИ УТРИМАННЯ КУРЧАТ

- При покупці курчат зверніть увагу на зовнішній вигляд.
- Перед посадкою курчат приміщення має бути продезінфіковане та прогріте.
- Забезпечте чистою та сухою підсилкою. Найкраще це тирса.
- Маленькі курчата не повинні контактувати з дорослою птицею.
- Уникайте протягів, потурбуйтеся про якісну вентиляцію для підтримки якісного повітря.
- **Щільність посадки:** із добового до 10-тижн. віку – 10 голів на 1 м², у період 10-17 тижнів – 8 голів на 1 м² підлоги, після 18 тижнів – 5-6 голів на 1 м² підлоги.
- **Фронт годівлі** для курчат до 4-тижн. віку 2,5-3 см на голову, із 5 до 9-тижневого – 5 см, після 9-тижневого – 7-10 см.
- Для напування до 2-тижн. віку користуйтеся вакуумною напувалкою (напувалка, на котру встановлюють перевернуту банку з водою). Фронт напування не менше 2,5-3,5 см на голову.
- Вода завжди повинна бути доступною для курчат. Вона має бути: чистою, свіжою, якісною, прохолодною (але не холодною), вільною від патогенів.



Без достатньої кількості води знижується споживання корму, птиця починає гірше рости.

УТРИМАННЯ КУРЕЙ-НЕСУЧОК


- Оптимальна температура у приміщенні 23-25 °С. В зимовий період температура в приміщенні має бути в межах +12+18 °С для високої несучості птиці.
- **Якщо температура – нижче норми, ваші несучки перестануть нести яйця.**
- Відносна вологість 60-70%, повітря має бути свіжим, без протягів.
- Освітлення не менше 12 годин на добу, бо якщо влітку птиці досить природного світла, то взимку його не вистачає.
- **Щільність посадки:** 9 курей-несучок на 1 м²
- Сідала знаходяться максимум на 1,2 м від підлоги біля вікна.
На 1 несучку – 20 см сідала. Відстань між перекладинами – 50 см.
- Гнізда – дерев'яні ящики, які наповнюють соломою, сіном.
1 гніздо на 5-6 несучок. Гнізда розміщують у куточках приміщення.
- **Годівниці.** На 1 несучку 10-15 см годівниці. Рекомендується розмістити їх над підлогою, щоб птиця не розгрібала корм. Годівниці мають бути завжди чистими та сухими.



Дотримуйтеся режиму годівлі птиці. Курей годують 3-4 рази на добу.

мій ДВОРЕК - мій ЗАРОБІТОК

ОЗНАКИ ЗДОРОВОЇ ПТИЦІ



- ГОЛОВА** – широка, пропорційна.
- ДЗЬОБ** – правильної форми, пігментований.
- ОЧІ** – круглі, блискучі.
- СПИНА** – рівномірна, помірно довга.
- КРИЛА** – щільно притиснуті до тулуба.
- ЖИВІТ** – на дотик м'який, підібраний.
- ПУХ** – рівномірно розподілений по тілу, гладкий.
- КЛОАКА** – чиста, рожева, волога.

ТЕМПЕРАТУРНИЙ РЕЖИМ ТА ОСВІТЛЕННЯ

Вік, тижнів	Температурний режим, °С	Відносна вологість, %
1	32-34	65-70
2	28-31	
3	26-28	
4	24-26	
5	22-24	55-60
6	20-22	
7	Не нижче 18	



Режим освітлення залежить від віку, напряму продуктивності. Тривалість освітлення у перші чотири дні 23 години, потім до кінця першого тижня зменшується до 15 годин, до кінця четвертого тижня — до 9 годин, і зберігається на такому рівні до 18-тижневого віку.

ЕФЕКТИВНЕ ВИРОЩУВАННЯ КУРЧАТ ТА НЕСУЧОК КОМБІКОРМАМИ DVOREK

Показники	Одиниці вимірювання	Комбікорм для курчат, качок та гусей СТАРТЕР 0-8 тижнів	Комбікорм для курчат ВИРОЩУВАННЯ 9-16 тижнів	Комбікорм для несучок ПРОДУКТИВНИЙ ПЕРІОД
Обмінна енергія	Ккал/100г	295	275	270
Сирий протеїн	%	19	14,5	16,5
Сира клітковина	%	4,5	4,5	5,5
Лізин	%	1,10	0,66	0,82
Метіонін	%	0,46	0,34	0,41
Метіонін+Цистин	%	0,78	0,63	0,71
Треонін	%	0,70	0,51	0,58
Кальцій	%	1,00	0,92	3,60
Фосфор засвоюваний	%	0,45	0,37	0,42
Вітамін А	МО/кг	12500	12500	10000
Вітамін D3	МО/кг	3000	3000	2750

мій ДВОРЕК - мій ЗАРОБІТОК

ЕФЕКТИВНЕ ВИРОЩУВАННЯ НЕСУЧОК НА ОСНОВІ БМВД ТА ПРЕМІКСІВ DVOREK

Показники	Одиниці вимірювання	БМВД	ПРЕМІКСИ
		20%	2,5%
Обмінна енергія	МДЖ/кг	5,4	3
Сирий протеїн	%	21	12,5
Лізін	%	2	8,4
Метіонін	%	0,8	2
Кальцій	%	16,5	20
Фосфор доступний	%	1,7	10,9
Натрій	%	0,6	5,2
Вітамін А	МО/кг	50000	500000
Вітамін D3	МО/кг	13750	120000
Вітамін Е	мг/кг	100	1200
Біотин	мг/кг	0,25	2,0
Кислота фолієва	мг/кг	3	30
Ніацин	мг/кг	175	1600
Кальцію пантоненат	мг/кг	50	400
Холін хлорид	мг/кг	2000	20000
Мідь	мг/кг	35	280
Цинк	мг/кг	300	2400
Марганець	мг/кг	455	3640
Залізо	мг/кг	267,5	2140
Йод	мг/кг	5	40
Селен	мг/кг	1,25	10
Антиоксидант	мг/кг	введено	введено
Підкислювач	мг/кг	введено	введено
Мультиензимний комплекс	мг/кг	введено	введено
Сорбент токсинів	мг/кг	введено	введено

ПРИКЛАДИ РЕЦЕПТІВ ЗМІШУВАННЯ ГОТОВИХ КОМБІКОРМІВ НА ОСНОВІ БМВД ТА ПРЕМІКСІВ ДЛЯ НЕСУЧОК

Показники	Одиниці вимірювання	БМВД	ПРЕМІКСИ
		від 17 тижнів	
Кукурудза	%	30	40
Пшениця	%	28	11,5
Макуха соняшникова	%	22	23
Макуха соєва	%	-	14
Вапняк кормовий	%	-	9
БМВД несучка 20%	%	20	-
Премікс несучка 2,5%	%	-	2,5
Всього:	%	100	100

Замовити продукцію: **0 800 211 040***

DVOREK.COM.UA

* дзвінки з усіх операторів безкоштовні в межах України